SARPRA

Herbicida.
Concentrado soluble (SL)

Composición:	MCPA (sal isopropilamina).....18% p/v GLIFOSATO (sal isopropilamina).....18% p/v
Formulación:	Concentrado soluble (SL)
Envases:	1 y 5 l
Nº Registro:	21042
Clasificación Toxicológica:	Xn: nocivo.

SARPRA Asociación de glifosato (herbicida sistémico, no selectivo, de absorción foliar) y MCPA (herbicida hormonal sistémico, selectivo, de absorción foliar y radical. Puede ser utilizada en el control en postemergencia de crucíferas (jaramagos, rabanizas, etc…), Portulaca oleracea (verdolaga), Urtica urens (ortiga menor) y otras monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales y perennes, asi como el control de Equisetsum arvense (cola de caballo).

Modo de empleo:

Aplicaciones autorizadas:
Tratamientos herbicidas en cultivos, plantaciones agrícolas, cercas y linderos de:
Cítricos, frutales de pepita, cereales en presiembra, márgenes de cultivos y olivo, contra malas hierbas anuales y vivaces en post-emergencia de las mismas; olivo, también para la supresión de rebrotes.

Dosis y modo de empleo:
Aplicar en pulverización a baja presión a dosis de 6-7,5 l/ha para control de malas hierbas vivaces y 4-6 Lt/Ha para el control de malas hierbas anuales.
En cereales, aplicar en presiembra del cultivo. Evitar el tratamiento en épocas de frío.
En cítricos, frutales de pepita y olivo aplicar en tratamientos dirigidos y plantaciones de más de 3-4 años. En estos cultivos y contra malas hierbas anuales se puede rebajar la dosis hasta 3 l/ha cuando las infestaciones estén en preemergencia precoz.
En márgenes de cultivos contra malas hierbas anuales se puede rebajar la dosis hasta 3 l/ha cuando las infestaciones estén en preemergencia precoz.
En olivo para la supresión de rebrotes, aplicar en tratamientos dirigidos y plantaciones de más de 3-4 años, cuando las varetas estén poco desarrolladas (menos de 25 cm.).
SARPRA podrá aplicarse en máquinas especiales de bajo volumen (20 l. de caldo/ha.) ULV con tamaño de gota controlada, a tal fin se recomienda las siguientes: Jucos, Jucos sectoriales, Micro-geno, Micro-genosectorial, Micron Herbi, Tecnoma, UBV Herbicida, Compact y Superpro.

Mitigación de riesgos medioambientales :

SPe 6: Para proteger los mamíferos silvestres y las aves, recójase todo derrame accidental
Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cultivos herbáceos y 20 m. en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

Observaciones:

En todo caso se deberá evitar mojar las partes útiles de los cultivos para evitar fitotoxicidades. Después de la aplicación de SARPRA enjuagar con agua limpia el equipo de pulverización para evitar corrosiones.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Primeros auxilios:
Retire a la persona de la zona contaminada
Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.Lave la piel con abundante agua y jabón , sin frotar.En caso de ingestión, y si la persona está consciente, PROVOQUE EL VÓMITO.No dar li leche ni grasas.Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos:
- En caso de ingestión lavado gástrico. Administrar carbón activado y catártico salino
-Tratamiento sintomático.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono (91) 562.04.20

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al deposito del pulverizador.
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema integrado de gestión SIGFITO.